MBL/WHOI
0 0301 0014120 6

LES

CHAMPIGNONS

(FUNGI, HYMENOMYCETES)

QUI CROISSENT EN FRANCE

DESCRIPTION ET ICONOGRAPHIE

PROPRIETES UTILES OU VENENEUSES

PAR

C. C. GILLET

VETERINAIRE PRINCIPAL EN RETRAITE
MEMBRE CORRESPONDANT DE LA SOCIETE LINNEENNE DE NORMANDIE

ATLAS

PARIS

LIBRAIRIE J. B. BAILLIERE ET FILS

19, rue Hautefeuille, pres du boulevard Saint-Germain

L'auteur, rue de l'Adoration, 23, a Alencon (Orne)

1878

Tous droits reserves

10178

AGARICINEES.

600. Lepiota lenticularis.
601. id. holosericea.
602. id. strobiliformis.
603. id. echinocephala.
604. id. granulosa.
605. Armillaria mucida.
606. id. mellea.
607. Tricholoma flavobrunneum.
608. id. Guernisaci.
609. id. imbricatum.
610. id. sulfureum.
611. id. lilacinum,—cœlatum
612. id. gambosum.
613. id. sœvum.
614. id. schumacheri.
615. Clitocybe geotropus.
616. id infundibuliformis.
617. id. cyathiformis.
618. id. nebularis.
619. id. odora.
620. id. insignis.
621. id. angustissima,—papillata.
622. id. Pelletieri.
623. id. laccata.
624. Hygrophorus chrysodon.
625. id. hypothejus.
626. id. pratensis.
627. id. amœnus.
628. id. psittacinus.
629. Lepista Alexandri.
630. Lactarius deliciosus.
631 id. uvidus.
632. id. chrysorheus.
633. id. torminosus.
634. id. pyrogalus.
635. Russula nigricans.
636. id. virescens.
637. id. fœtens.
638. id. aurata.
639. id. punctata.
640. id. pura.
641. Mycena hœmatopus,—Cruenta.
642. id. Iris;—pelianthina.
643. id. capillaris;—setosa;—juncicola;—stipularis.
644. Omphalia chrysophylla;—affricata.
645. id. cyanophylla;—umbratilis;—fibula.
646. Collybia fusipes.
647. id. butyracea.
648. id. fœtidissima.
649. Pleurotus applicatus;—ungicularis;—Striatulus.
650. id. id. glandulosus.
651. id. cibarius.
652. Cantharellus aurantiacus.
653. Nyctalis parasitica.
654. Marasmius oreades.
655. Schizophyllum commune.
656. Lenzites flaccida.
657. Lentinus tigrinus.
658. Panus stopticus.
659. Volvaria loveiana.
660. id. speciosa.
661. Annularia Fenzlii.
662. Pluteus chrysophœus.
663. Entoloma lividus.
664. Clitopilus prunulus.
665. Leptonia kervernii.
666. Nolaneus picea.
667. Claudopus variabilis;—bissisedus.
668. Locellina Alexandri.
669. Pholiota phragmatophylla.
670. id. radicosa.
671. id. spectabilis.
672. Cortinarius elatior.
673. id. violaceus.
674. id. sublanatus.
675. id. semisanguineus.
676. id. torvus.
677. id. armillatus.
678. id. armeniacus.
679. Inocybe pyriodorus.
680. Hebeloma elatus.
681. Flammula carbonaria.
682. Naucoria sobria;—limbata.
683. Galera pubescens.
684. Pratella pratensis.
685. id. rubella.
686. Hypholoma Gilletii.
687. Stropharia œruginosa.
688. Psylocybe semilanceatus.
689. Bolbitius titubans—conocephalus.
690. Coprinus picaceus.
691. Psathyrella gracilis.
692. Panœolus retirugis.
693. Gomphidius glutinosus.
694. Boletus strobilaceus.
695. id. versipellis.
696. id. luridus.
697. id. edulis.
698. Fistulina hepatica.
699. Polyporus lucidus.
700. Fomes igniarius.
701. Merisma umbellatus.
702. Trametes gibbosa.
703. Dedalea quercina.
704. Hydnum repandum.
705. Craterellus cornucopioides.
706. Auricularia messenterica.
707. Thelephora laciniata.
708. Stereum hirsutum.
709. Calocera viscosa;—cornea.
710. Clavaria pistillaris.
711. id. botrytis.
712. Typhula filiformis;—Pistillaria micans.
713. Exidia glandulosa.
714. Tremella mesenterica;—lutescens.
715. Dacrymyces chrysocomus;—deliquescens;—stillatus.
716. Phallus impudicus.

Pl. I

1 Cellules du parenchyme des Agaricinées.— 2 Pratella campestris et son mycélium.— 3 Coupe du chapeau.— 4, 5 Basides et spores.

Hyménomycètes

1 Amanita bulbosa V. alba. — 2 Pleurotus atrocœruleus — 3, 4, 5, 6, 7, 8 spores. — 9 Portion d'hyménium.

LEPIOTA LENTICULARIS Fr

½ Gr Nelle



LEPIOTA HOLOSERICEA fr
Gr Nelle

LEPIOTA STROBILIFORMIS Gillet

G^r N^elle

LEPIOTA ECHINOCEPHALA
A. Gr. nlle

ARMILLARIA MUCIDA fr
G^r N^elle

ARMILLARIA MELLEA fr
G^r N^elle

Agaricinées

TRICHOLOMA FLAVOBRUNNEUM. Fr.

Gille

TRICHOLOMA GUERNISACI Grouan
$\frac{2}{3}$ Gr Nelle

Agaricinées

TRICHOLOMA IMBRICATUM Fr.

Mlle

Agaricinées

TRICHOLOMA SULFUREUM Fr.

Gr Nelle

Agaricinées

1 2 3 4 5 [illegible] PLECTINUM Gilbert Gr Nelle

6 7 8 [illegible] CŒLATUM [illegible] Gr Nelle



TRICHOLOMA GAMBOSUM Fr

Gt Nelle

TRICHOLOMA SŒVUM

3/4 Gr.lle

TRICHOLOMA SCHUMACHERI Fr

Gr Nelle

CLITOCYBE GEOTROPUS Fr
3/4 Gr Nelle

CLITOCYBE INFUNDIBULIFORMIS Fr.
Gr. Nelle



CLITOCYBE CYATHIFORMIS fr.
Grnlle

CLITOCYBE NEBULARIS Fr

3/4 Gr Nelle

CLITOCYBE ODORA Fr
Gr Nelle

CLITOCYBE INSIGNIS (Boulet)
¾ Gr Nat.

1·2 CLITOCYBE ANGUSTISSIMA Er Gr Nelle
3·4·5·6·7 CLITOCYBE PAPILLATA Gillet Gr Nelle

CLITOCYBE PELLETIERI Lev
Cp Nelle

CLITOCYBE LACCATA Scop
Gr Nelle

HYGROPHORUS CHRYSODON Fr
Gr Nelle

HYGROPHORUS HYPOTHEJUS Fr
Gr Nelle

HYGROPHORUS PRATENSIS Fr
Gr N^elle

HYGROPHORUS AMŒNUS Lasch
Gr Nelle

HYGROPHORUS PSITTACINUS Fr.
Gr nlle.

LEPISTA ALEXANDRI . Gillet

LACTARIUS DELICIOSUS L
Gén.le

LACTARIUS UVIDUS, Fr

LACTARIUS CHRYSORHEUS, Fr.
Gr. p. III

LACTARIUS TORMINOSUS, SCHŒFF.

2/3 Gr.lle

LACTARIUS PYROGALUS Fr.
Gf. nlle

RUSSULA NIGRICANS, BULL.
1/2 Gr.lle

RUSSULA VIRESCENS, Fr.

Gr. nelle

RUSSULA FŒTENS, Fr.

3/4 Gr. nelle

RUSSULA AUPATA h

Cr nelle

[illegible] PUNCTATA, GILLET.

[illegible] n^elle

MYCE'NA PURA, Fr



MYCENA PELIANTHINA, Fr. + MYCENA IRIS. *Berkl.*

1 MYCENA CAPILLARIS, Fr. ? MYC. STIPOSA, Sow.

3 MYC. JUNCICOLA, Fr. MYC. STIPULARIS, Fr.

1. OMPHALIA CHRYSOPHYLLA Fr.

2 O. AFFRICATA Fr.

1. OMPHALIA CYANOPHYLLA. Fr. 2. O UMBRATILIS. Fr.
3. O. FIBULA Fr.

COLLYBIA FUSIPES, Fr.

Gr nelle

COLLYBIA BUTYRACEA. Fr.

COLLYBIA FŒTIDISSIMA . Gillet .

1 PLEUROTUS APPLICATUS. Fr

2 PL. UNGUICULARIS Fr. 3. PL. STRIATULUS. Fr

PLEUROTUS GLANDULOSUS. Fr.

1/3 Gr nelle

CANTHARELLUS CIBARIUS fr.
G^t n^lle

CANTHARELLUS AURANTIACUS. Fr.

NYCTALIS PARASITICA Fr

MARASMIUS OREADES, Bolt.

Gen^lle

SCHIZOPHYLLUM COMMUNE. Fr.

LENZITES FLACCIDA . Fr.

LENTINUS TIGRINUS . Fr

Agaric. Fées

PANUS STIPTICUS fr.

Gr n.lle

VOLVARIA LOVELIANA. Berk.

VOLVARIA SPECIOSA. Fr

$\frac{3}{4}$ Gr. nelle

ANNULARIA FENZLII . Schulz

PLUTEUS CHRYSOPHŒUS Schœff.

ENTOLOMA LIVIDUS. Fr.

Agaricinées

LEPTOPILUS PRUNULUS . Fr.

LEPTONIA KERVERNII. Guern

NOLANEA [illegible]

1. CLAUDOPUS VARIABILIS. Pers.

2. CL. BISSISEDUS. Pers.

LEPIOTA ALEXANDRI. Gillet.

PSILOCTA PHRAGMATOPHYLLA Guern

PHOLIOTA RADICOSA. Fr.

PHOLIOTA SPECTABILIS Fr

½ Gr nelle

Agaricinées

LORTINARIUS CRATIUR Fr.

CORTINARIUS VIOLACEUS . F.

CORTINARIUS SUBLANATUS. *Sowerb.*

CORTINARIUS SEMI SANGUINEUS Pr

CORTINARIUS TORVUS Fr.

CORTINARIUS ARMILLATUS Fr.

3/4 Gr.elle

CORTINARIUS ARMENIACUS Fr

INOCYBE PYRIODORUM Pers.

HEBELOMA ELATUS Batsch

FLAMMULA CARBONARIA Fr.

1. NAUCORIA SOBRIA. Fr. - 2. NAUCORIA LIMBATA. Fr.

GALERA PUBESCENS Gillet

PRATELLA PRATENSIS, Fr.

PRATELLA RUBELLA, Gillet.

HYPHOLOMA GILLETII Fr

STROPHARIA ÆRUGINOSA. Fr.

PSYLOCYBE SEMILANCEATUS . Fr

1 BOLBITIUS TITUBANS VEL BOLBITIUS [illegible]

COPRINUS PICACINUS F.

PSATHYRELLA GRACILIS Fr

GOMPHIDIUS GLUTINOSUS Fr.

Gr. nde

BOLETUS STROBILACEUS. Fr

BOLETUS VERSIPELLIS. P.

BOLETUS LURIDUS. Schœff

BOLETUS EDULIS, BULL.

1/2 Gr.nle

FISTULINA HEPATICA, Fr.

POLYPORUS LUCIDUS. Fr.

FOMES IGNIARIUS . Fr

MERISMA UMBELLATUS, Fr

TRAMETES GIBBOSA, Fr.

DŒDALEA QUERCINA PERS.
½ Gr. nat.

HYDNUM REPANDUM, L

Gr nle

CRATERELLUS CORNUCOPIOÏDES, Pers.

AURICULARIA MESENTERICA, Bull

THELEPHORA LACINIATA. Pers

STEREUM HIRSUTUM, Fr.



1. CALOCERA VISCOSA, Fr.

2. CALOCERA CORNEA, Fr.

CLAVARIA PISTILLARIS, Bull

CLAVARIA BOTRYTIS, Fr.

1. TYPHULA FILIFORMIS, Fr.
2. PISTILLARIA MICANS, Fr.

EXIDIA GLANDULOSA, Fr.

1. TREMELLA MESENTERICA. Retz.

2. TREMELLA LUTESCENS. Pers.

1 DACRYMYCES CHRYSOCOMUS, Tul.

2 D. DELIQUESCENS, Dub. 3. D. STILLATUS, Nées

PHALLUS IMPUDICUS, L.